



Trang chủ > Thuốc Thông Dụng > Thuốc điều trị nhiễm khuẩn

Thuốc Thông Dụng

Thuốc điều trị nhiễm khuẩn

Thuốc Augmentin 100mg (Amoxicillin) công dụng, liều dùng

Bởi Võ Mộng Thoa - 13/08/2020

15 0



Thuốc Augmentin là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị các triệu chứng của nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau do vi



lây ra như nhiễm trùng đường hô hấp dưới, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Công dụng, liều

dùng, cách dùng thuốc ra sao? Tác dụng phụ của thuốc là gì? Cùng **ThuocDacTri247** tìm hiểu bên dưới bài viết.

Nội Dung Bài Viết



Thông tin thuốc Augmentin

- Tên sản phẩm thuốc: Viên nén Augmentin
- Dạng bào chế: Viên nén.
- Nhóm: Thuốc kháng sinh, kháng virus
- Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline (Anh)
- Sản xuất tại Pháp Viên nén bao phim hình bầu dục từ trắng đến trắng nhạt có khắc chữ 'AC' và vạch số ở một mặt. Vạch điểm chỉ để tạo điều kiện bẻ cho dễ nuốt và không chia thành các liều lượng bằng nhau.

Thuốc Augmentin là gì?



Liên Hệ

Thuốc Augmentin điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra

Augmentin là một loại thuốc kháng sinh theo toa. Nó được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. Thuốc thuộc nhóm thuốc kháng sinh penicillin.

Augmentin chứa hai loại thuốc: amoxicillin và axit clavulanic. Sự kết hợp này làm cho hoạt động chống lại nhiều loại vi khuẩn hơn là kháng sinh chỉ chứa amoxicillin.

Công dụng của Augmentin



Augmentin có hiệu quả để điều trị nhiễm trùng do nhiều loại vi khuẩn khác nhau gây ra. Chúng bao gồm vi khuẩn gây ra:

- Viêm phổi
- Nhiễm trùng tai
- Viêm xoang
- Nhiễm trùng da
- Nhiễm trùng đường tiết niệu

Liều dùng thuốc Augmentin bao nhiêu?

Liều dùng đối với người lớn

- Liều thông thường cho người lớn là một viên Augmentin 500 mg mỗi 12 giờ hoặc một viên Augmentin 250 mg mỗi 8 giờ.
- Đối với các bệnh nhiễm trùng nặng hơn và nhiễm trùng đường hô hấp, liều dùng nên là một viên Augmentin 875 mg mỗi 12 giờ hoặc một viên Augmentin 500 mg mỗi 8 giờ.
- Người lớn gặp khó khăn khi nuốt có thể dùng hỗn dịch 125 mg / 5 mL hoặc 250 mg / 5 mL thay cho viên 500 mg. Hỗn dịch 200 mg / 5 mL hoặc hỗn dịch 400 mg / 5 mL có thể được sử dụng thay cho viên nén 875 mg.
- Hai viên Augmentin 250 mg không được thay thế cho một viên Augmentin 500 mg.

Liều dùng đối bệnh nhân nhi



Liều dùng thuốc Augmentin đối với bệnh nhân nhi

Dựa trên thành phần amoxicillin, Augmentin nên được định lượng như sau:

- Trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh có độ tuổi <12 tuần (<3 tháng)
- Liều khuyến cáo của Augmentin là 30mg / kg / ngày chia mỗi 12 giờ, dựa trên thành phần amoxicillin.
- Kinh nghiệm với công thức 200mg / 5mL ở nhóm tuổi này còn hạn chế, do đó, khuyến cáo sử dụng hỗn dịch uống 125 mg / 5 mL.

Quên liều thuốc Augmentin

- Dùng thuốc càng sớm càng tốt, nhưng bỏ qua liều đã quên nếu gần đến giờ dùng liều tiếp theo.
• Không dùng hai liều cùng một lúc.



Quá liều lượng của Augmentin

Nếu ai đó đã sử dụng quá liều và có các triệu chứng nghiêm trọng như bất tỉnh hoặc khó thở, hãy gọi 911 hoặc đến trung tâm cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc kịp thời.

Cách dùng thuốc Augmentin


Hãy dùng Augmentin chính xác theo quy định của bác sĩ. Làm theo tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn và đọc tất cả các hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc tờ hướng dẫn

- Augmentin có thể hoạt động tốt nhất nếu bạn dùng nó vào đầu bữa ăn.
- Uống thuốc 12 giờ một lần.
- Không nghiền nát hoặc nhai viên thuốc kéo dài.
- Nuốt toàn bộ viên thuốc hoặc bẻ đôi viên thuốc và uống cả hai nửa viên một lần.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn gặp khó khăn khi nuốt cả viên hoặc nửa viên.
- Lắc hỗn dịch uống (chất lỏng) trước khi bạn đo liều. Sử dụng ống tiêm định lượng được cung cấp hoặc sử dụng thiết bị đo liều lượng thuốc (không phải thìa nhà bếp).

Tác dụng phụ Augmentin

Tác dụng phụ nghiêm trọng

- Đau da sau đó phát ban đỏ hoặc tím lan rộng (trên mặt hoặc phần trên cơ thể) với mụn nước và bong tróc.
- Đau dạ dày nghiêm trọng.
- Tiêu chảy có nước hoặc có máu.
- Da nhợt nhạt hoặc vàng.
- Nước tiểu sẫm màu.
- Vàng da hoặc mắt (vàng da).
- Dễ bị bầm tím hoặc chảy máu.
- Ít hoặc không đi tiểu.
- Đau họng.
- Đau mắt hoặc lưỡi của bạn,
- Chảy trong mắt bạn,



- Sốt.
- Lú lẫn.
- Yếu đuối.
- Ăn mất ngon.
- Đau bụng trên.

Tác dụng phụ phổ biến

- Buồn nôn.
- Bệnh tiêu chảy.
- Ngứa hoặc tiết dịch âm đạo.

Lời khuyên an toàn khi dùng thuốc Augmentin

- Bạn không nên sử dụng Augmentin nếu bạn bị dị ứng với amoxicillin và clavulanate.
- Bạn bị bệnh thận nặng (hoặc nếu bạn đang chạy thận nhân tạo);
- Gặp vấn đề về gan hoặc vàng da khi dùng amoxicillin và clavulanate potassium; hoặc là
- Bạn bị dị ứng với bất kỳ loại kháng sinh penicilin hoặc cephalosporin nào, chẳng hạn như Amoxil, Cefitin, Cefzil, Moxatag, Omnicef và những thuốc khác.

Để đảm bảo Augmentin an toàn cho bạn, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có:

- Bệnh gan (viêm gan hoặc vàng da).
- Bệnh thận.
- Tăng bạch cầu đơn nhân.
- Chất lỏng có thể chứa phenylalanin. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị phenylketon niệu.
- Cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú.
- Có thể làm cho thuốc tránh thai kém hiệu quả hơn.

Tương tác thuốc Augmentin



Augmentin có thể ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột


Thuốc Probenecid

Probenecid làm giảm bài tiết amoxicilin ở ống thận nhưng không làm chậm bài tiết acid clavulanic qua thận. Sử dụng đồng thời với Augmentin có thể làm tăng và kéo dài nồng độ amoxicillin trong máu. Không nên dùng đồng thời với probenecid.

Thuốc uống chống đông máu

Sự kéo dài bất thường của thời gian prothrombin (tăng tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế) đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng amoxicillin và thuốc chống đông máu đường uống.

Thuốc Allopurinol

 Sử dụng đồng thời allopurinol và amoxicillin làm tăng tỷ lệ phát ban ở bệnh nhân dùng cả hai thuốc so với bệnh nhân chỉ dùng amoxicillin. Người ta không biết liệu chứng phát ban do

amoxicillin gây ra là do allopurinol hay do tăng acid uric máu ở những bệnh nhân này.

Thuốc uống tránh thai

Augmentin có thể ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột, dẫn đến giảm tái hấp thu estrogen và giảm hiệu quả của thuốc tránh thai kết hợp estrogen/progesterone dạng uống .

Lưu trữ thuốc Augmentin ra sao?

- Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
- Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp, chai hoặc vỉ sau EXP. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.
- Không lưu trữ trên 30 ° C.
- Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ các loại thuốc bạn không còn sử dụng. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Thuốc Augmentin giá bao nhiêu?




Tham khảo giá thuốc Augmentin tại các nhà thuốc

- Để tham khảo giá thuốc Augmentin bao nhiêu? Liên hệ **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) hoặc Bình Luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc.

Thuốc Augmentin mua ở đâu?

- Để tham khảo mua thuốc Augmentin ở đâu? Liên hệ **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) hoặc Bình Luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc.

**** Chú ý:** Thông tin bài viết về thuốc Augmentin 100mg với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

 **Website Thuocdactri247.com:** Không bán lẻ dược phẩm, mọi thông tin trên website bao gồm: hình ảnh, âm thanh hoặc các định dạng khác được tạo ra chỉ nhằm mục đích cung cấp thông

tin cho quý đọc giả tham khảo các thông tin về bệnh. Chúng tôi không hoạt động bán lẻ dược phẩm dưới bất kỳ hình thức nào trên Website.

Nguồn Tham khảo

Xem thêm bài viết liên quan

- [Thuốc Bosulif 100mg, 500mg Bosutinib: Công dụng, Liều dùng](#)
- [Thuốc Elbonix \(Eltrombopag 25mg/50mg\): Công dụng,...](#)
- [Thuốc Aricept 5mg Donepezil: Công dụng, liều dùng, cách dùng](#)

TAGS Amoxicillin 100mg Amoxicillin thuốc gì Augmentin 100mg Augmentin thuốc gì công dụng thuốc Amoxicillin công dụng thuốc Augmentin giá thuốc Amoxicillin giá thuốc Augmentin nhiễm trùng Thuốc Amoxicillin thuốc Amoxicillin 100mg thuốc Amoxicillin giá bao nhiêu thuốc Amoxicillin mua ở đâu Thuốc Augmentin thuốc Augmentin 100mg thuốc Augmentin giá bao nhiêu thuốc Augmentin mua ở đâu

 Like 0

 Facebook  Twitter 

Võ Mộng Thoá

<https://thuocdactri247.com/>

Bác sĩ Võ Mộng Thoá với nhiều năm kinh nghiệm với các căn bệnh ung thư


Chuyên khoa: Ung thư

Kinh nghiệm:

- Từ 2011 - 2012: Bác sĩ nội trú khoa ung thư, Bệnh viện HenRi Mondor, Cresteeil, Cộng hòa pháp
- Từ 2012 - Nay: Giảng viên bộ môn ung thư Đại Học Y Dược TP.HCM
- Các kiến thức về thuốc điều trị ung thư hiệu quả

Chứng nhận:

Bác sĩ Đa Khoa, Đại Học Y Dược Tp.HCM



Thạc Sĩ chuyên ngành ung thư - ĐHYD - TP.HCM



BÌNH LUẬN

Bình luận:

Tên:*

Email:*

Website:

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thuốc Lantus solostar 100U/ml (Insulin Glargine) điều trị bệnh tiểu đường

Thuốc Azilect 1mg (Rasagiline) điều trị bệnh Parkinson

Thuốc Baraclude 0.5mg Entecavir: Công dụng, liều dùng

Thuốc Augmentin 100mg (Amoxicillin) công dụng, liều dùng

Thuốc Avonza Mylan hộp 30 viên, công dụng, tác dụng phụ



MỤC XEM NHIỀU

Thuốc Điều Trị Ung Thư Phổi

Thuốc erlocip 150mg erlotinib

Thuốc gefinat 250mg gefitinib

Thuốc iressa 250mg gefitinib

Thuốc giotrif 40mg afatinib

Trang Thông Tin Tra Cứu

Website Thuocdactri247 dạng tin tức, chia sẻ thông tin kiến thức. Nội dung chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo, không nhằm mục đích quảng cáo, không được tự ý áp dụng. Bệnh nhân sử dụng thuốc phải tuân theo chỉ định bác sĩ...

(CHÚNG TÔI KHÔNG KINH DOANH)

Địa chỉ: Số 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thuốc Điều Trị Ung Thư Trực Tràng

Thuốc xeloda 500mg capecitabine

Thuốc stivarga 40mg regorafenib

Thuốc regonix 40mg regorafenib

Thuốc xeltabine 500mg capecitabine

Giới Thiệu Chính Sách

Giới thiệu Thuốc Đặc Trị 247

Liên hệ chúng tôi



Liên Hệ

miễn trừ trách nhiệm

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Thuốc Thông Dụng

Meloxicam (Mobic 7.5mg và 15mg)

Paracetamol (acetaminophen 500mg)

Phosphalugel® 20g (aluminim phosphate)

Thuốc Smecta® Diosmectite – Hộp 30 gói

[Trang chủ](#) [Bệnh ung thư](#) [Thuốc Ung Thư](#) [Thuốc Thông Dụng](#) [Bản tin sức khỏe](#)

© 2015 || [Thuốc Đặc Trị 247](#) || Chia sẻ những kiến thức về thuốc, bài thuốc hay, nội dung mang tính tham khảo. Mọi thông tin về sử dụng thuốc cần thông qua ý kiến bác sỹ chuyên môn. PASS: 123chienthang

