

Thuốc Smecta diosmectite điều trị tiêu chảy, đau dạ dày

By **Võ Mộng Thoa** - 09/05/2020

Thuốc Smecta diosmectite điều trị tiêu chảy, đau dạ dày



Smecta Diosmectite For Diestion Orange 10 Sachets giúp ngăn chặn các triệu chứng tiêu chảy và cũng đủ an toàn để sử dụng cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Nó cũng giúp giảm đau và các triệu chứng khác liên quan đến bệnh lý thực quản-dạ dày và đường ruột. Cùng Vietducinfo.com xem thêm nội dung chi tiết bên dưới...

Mô tả chi tiết thuốc **Smecta diosmectite**

- Smecta Diosmectite cho bệnh tiêu chảy Cam-Vanilla Hương vị 10 gói
- Thành phần: Diosmectite 3g. mỗi gói. Tá dược được biết là có tác dụng được công nhận. Glucose, sacarose. Dạng dược phẩm. Bột cho hỗn dịch uống. Quản trị. Tuyến đường miệng.
- Sản xuất sử dụng: Sản phẩm này cung cấp cứu trợ từ các triệu chứng tiêu chảy và các triệu chứng đau liên quan đến bệnh thực quản-dạ dày và đường ruột.
- Số lượng trong gói: 10
- Thương hiệu: Smecta
- Loại đóng gói: Hộp

Đối tượng sử dụng thuốc **Smecta diosmectite**

Thuốc bột Smecta được sử dụng cho những đối tượng sau:

- Trẻ nhỏ và người lớn bị tiêu chảy cấp – mãn tính
- Người thường xuyên đau bụng do các bệnh ở thực quản, dạ dày và đường ruột

Liều dùng Smecta diosmectite cho người lớn

- Mỗi ngày, người bệnh dùng từ 2-3 liều Smecta sao cho đủ 3 gói thuốc/ngày.
- Pha bột Smecta với 1/2 ly nước sạch (nước không nóng cũng không lạnh).
- Người bị tiêu chảy cấp tính có thể sử dụng liều lượng gấp đôi để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước.

Liều dùng Smecta diosmectite cho trẻ em

- Đối với trẻ em trên 2 tuổi: Dùng 2-3 gói thuốc Smecta/ngày.
- Đối với trẻ em từ 1-2 tuổi: Dùng 1-2 gói thuốc Smecta/ngày.
- Đối với trẻ em dưới 1 tuổi: Dùng chỉ 1 gói thuốc Smecta/ngày.

Cách sử dụng thuốc bột Smecta diosmectite

- Hòa tan gói thuốc với 50ml nước sôi để nguội
- Hoặc có thể trộn đều với thức ăn sệt như cháo hoặc súp
- Sau bữa ăn trong viêm thực quản,
- Giữa các bữa ăn trong chỉ định khác

Cảnh báo khi dùng Smecta diosmectite

- Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng không cải thiện trong vòng 7 ngày
- Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cơn đau liên quan đến sốt hoặc nôn
- Liên hệ với bác sĩ của bạn trước khi sử dụng nếu bạn đã được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp với một số loại đường
- Tránh xa tầm tay trẻ em

Tương tác thuốc Smecta diosmectite

- SMECTA® không nên được thực hiện với các loại thuốc hoặc thuốc khác.
- Để phòng ngừa SMECTA® không nên được thực hiện cùng lúc với một loại thuốc hoặc thuốc khác. Để tránh các tương tác có thể xảy ra giữa một số loại thuốc, hãy báo cáo bất kỳ điều trị đang diễn ra nào khác với bác sĩ hoặc nhà hóa học của bạn.
- Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc hoặc thuốc khác để tránh các tương tác có thể. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn

Bảo quản thuốc bột Smecta 3g

- Thuốc Smecta diosmectite được đóng gói ở dạng túi giấy. Vì vậy thuốc có thể bị hư hại, ẩm mốc và đổi màu nếu bảo quản sai cách.
- Để đảm bảo tác dụng của thuốc, bạn nên bảo quản thuốc dưới 25 độ C, tránh nơi ẩm mốc và ánh sáng trực tiếp. Dung dịch thuốc đã được pha cần sử dụng ngay, không nên để dung dịch này quá 24 giờ đồng hồ.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể lái xe hoặc vận hành máy nặng sau khi sử dụng Smecta không?

- Tùy thuộc vào phản ứng của Smecta sau khi uống, nếu bạn cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ hoặc bất kỳ điểm yếu nào như phản ứng trên cơ thể, thì hãy xem xét Smecta không an toàn để lái xe hoặc vận hành máy nặng sau khi tiêu thụ.
- Có nghĩa là, không lái xe hoặc vận hành máy móc hạng nặng sau khi uống viên nang nếu viên nang có phản ứng lạ trên cơ thể bạn như chóng mặt, buồn ngủ.
- Theo quy định của dược sĩ, sẽ rất nguy hiểm khi uống rượu trong khi dùng thuốc vì nó làm cho bệnh nhân buồn ngủ và nguy cơ về sức khỏe.
- Xin lưu ý về tác dụng như vậy nhất là khi dùng viên nang Primosa. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ đúng giờ để có khuyến nghị và tư vấn y tế phù hợp.

Là Smecta gây nghiện hoặc thói quen hình thành?

- Thuốc không được thiết kế với mục đích tạo ra sự nghiện hoặc lạm dụng đối với sức khỏe của người dùng. Thuốc gây nghiện được chính phủ gọi là các chất được kiểm soát. Chẳng hạn, Lịch H hoặc X ở Ấn Độ và lịch II-V ở Mỹ là các chất được kiểm soát.
- Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thuốc về cách sử dụng và đảm bảo nó không phải là chất được kiểm soát. Tóm lại, tự dùng thuốc là một kẻ giết người đối với sức khỏe của bạn. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn cho một toa thuốc, khuyến nghị và hướng dẫn thích hợp.

Bạn đang dùng thuốc Smecta theo chỉ định của bác sĩ?

- Một số loại thuốc có thể được sử dụng 4 lần trong một ngày nhiều hơn so với quy định khi lời khuyên của bác sĩ đề cập rằng thuốc có thể được sử dụng theo tần suất hoặc mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Hầu hết các lần, hãy rất cẩn thận và rõ ràng về số lần bạn đang dùng thuốc

Thời gian dùng thuốc Smecta là bao lâu để nó có hiệu quả hoặc để giảm các triệu chứng?

- Hầu hết các tình trạng mãn tính cần ít nhất một thời gian để liều lượng và tác dụng của thuốc được điều chỉnh theo cơ thể để có được hiệu quả mong muốn.
- Các chuyên gia cho biết người dùng trang web sdrugs.com cần 2 tuần để nhận thấy kết quả từ việc sử dụng thuốc Smecta.
- Thời gian cần thiết để cho thấy sự cải thiện về tình trạng sức khỏe sau khi sử dụng thuốc Smecta không cần phải giống nhau cho tất cả người dùng. Nó thay đổi dựa trên các yếu tố khác.

Chú ý: Nếu các triệu chứng của bạn vẫn còn, tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

Nguồn tham khảo

- Thuocdactri247: <https://thuocdactri247.com/thuoc-smecta/>. Truy cập ngày 01 tháng 7 năm 2020
- Daugiatuthien: <https://www.daugiatuthien.com.vn/gia-thuoc-smecta-bao-nhieu-mua-o-dau.html>. Truy cập ngày 01 tháng 7 năm 2020
- Thuốc Smecta: <https://www.moncoinsante.co.uk/smecta-diosmectite-3g-30-sachets.html>. Truy cập ngày 01 tháng 7 năm 2020

Tổng hợp: Vietducinfo.com

★★★★★ 5 / 5 (1 bình chọn)

Võ Mộng Thoạ

Bác sĩ Võ Mộng Thoạ với nhiều năm kinh nghiệm với các căn bệnh ung thư

Chuyên khoa: Ung thư

Kinh nghiệm:

- Từ 2011 – 2012: Bác sĩ nội trú khoa ung thư, Bệnh viện Henri Mondor, Cresteil, Cộng hòa pháp
- Từ 2012 – Nay: Giảng viên bộ môn ung thư Đại Học Y Dược TP.HCM
- Các kiến thức về thuốc điều trị ung thư hiệu quả

Chứng nhận:

- Bác sĩ Đa Khoa, Đại Học Y Dược Tp.HCM
- Thạc Sĩ chuyên ngành ung thư – ĐHYD – TP.HCM

Bác sĩ sẽ đồng hành cùng chúng tôi hỗ trợ kiến thức y khoa cũng như cung cấp các thông tin chính xác và hữu ích, giúp mỗi người có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn...

Cập nhật mới lúc 09/07/2020

Bài Viết Liên Quan:

- Thuốc Tarceva 150mg: Công dụng, liều dùng và cách dùng**
- Thuốc Xarelto 15mg: Công dụng, liều dùng và cách dùng**
- Thuốc Alkeran 2mg: Công dụng, liều dùng và cách dùng**
- Thuốc Lenalid 10mg/15mg/25mg: Công dụng, liều dùng và cách dùng**

Võ Mộng Thoạ

<https://thuocdactri247.com/>

Bác sĩ Võ Mộng Thoạ với nhiều năm kinh nghiệm với các căn bệnh ung thư

Chuyên khoa: Ung thư

Kinh nghiệm:

- Từ 2011 - 2012: Bác sĩ nội trú khoa ung thư, Bệnh viện Henri Mondor, Creteil, Cộng hòa pháp
- Từ 2012 - Nay: Giảng viên bộ môn ung thư Đại Học Y Dược TP.HCM
- Các kiến thức về thuốc điều trị ung thư hiệu quả

Chứng nhận:

- Bác sĩ Đa Khoa, Đại Học Y Dược Tp.HCM
- Thạc Sĩ chuyên ngành ung thư - ĐHYD - TP.HCM

Bác sĩ sẽ đồng hành cùng chúng tôi hỗ trợ kiến thức y khoa cũng như cung cấp các thông tin chính xác và hữu ích, giúp mỗi người có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn...