



Thuốc cellcept 500mg mycophenolate có công dụng gì

Bởi admin - 17/07/2017



Thuốc Cellcept 500mg Mycophenolate mofetil thải ghép thận, tim, gan - Giá thuốc Cellcept - Thuốc đặc trị 247

Thuốc **Cellcept 500mg Mycophenolate** dự phòng thải ghép thận, thải ghép tim, thải ghép gan, điều trị thải ghép tạng khó điều trị hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ **Thuốc Đặc Trị 247**  **0901 771 516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, tính mạng và sức khỏe con người bảo vệ tốt hơn với những bước tiến mới trong y học. Khi  một bộ phận trong cơ thể bị hư hỏng cần được thay thế để duy trì

sự sống. Nhưng đây là quá trình đi ngược tự nhiên, ngược với sự phát triển của cơ thể.

Do vậy, có những trở ngại tự nhiên từ chính cơ thể người bệnh. Cơ chế đào thải khi thực hiện các ca ghép thận chính là nguyên nhân gây ra sự thất bại của ca cấy ghép. **Thuốc cellcept chống đào thải** chính là giải pháp cứu cánh cho những trường hợp này.

Thuốc Cellcept 500mg là gì?

Thuốc cellcept 500mg thuộc phân nhóm thuốc ức chế miễn dịch, đã được kiểm định và chứng minh lâm sàng hiệu quả trong việc chống đào thải ghép tạng.

Thành phần của thuốc cellcept là mycophenolate mofetil. Thuốc có khả năng ức chế miễn dịch, ức chế sự phát triển của tế bào T và B. Cellcept được hấp thụ trực tiếp qua hệ tiêu hóa và chuyển hóa thành hoạt chất acid mycophenolic có tác dụng hiệu quả trong việc ức chế miễn dịch, chống lại quá trình đào thải các bộ phận mới

Nội Dung Bài Viết



Thông tin cơ bản thuốc Cellcept 500mg Mycophenolate



- Tên thương hiệu: **Cellcept**
- Thành phần hoạt chất: **Mycophenolate**
- Hãng sản xuất: Roche
- Hàm lượng: 500mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Hộp 50 viên nhộng

Giá thuốc cellcept: Bình Luận bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage **Thuốc Đặc Trị 247**



Thuốc Cellcept 500mg Mycophenolate mofetil thải ghép thận, tim, gan – Giá thuốc Cellcept – Thuốc đặc trị 247 (1)

Chỉ định điều trị thuốc **Cellcept 500mg**

Ghép thận, tim và ghép gan:



- Thuốc CellCept được chỉ định để điều trị dự phòng thải ghép nội tạng ở những bệnh nhân được ghép thận, tim hoặc ghép gan. Thuốc CellCept nên được sử dụng đồng thời với cyclosporine và corticosteroid.
- Thuốc CellCept tiêm tĩnh mạch là một dạng bào chế thay thế cho viên nang, viên nén và thuốc uống CellCept. Nên tiêm tĩnh mạch thuốc CellCept trong vòng 24 giờ sau khi ghép.
- Thuốc CellCept tiêm tĩnh mạch có thể được dùng trong tối đa 14 ngày bệnh nhân nên được chuyển sang thuốc CellCept uống ngay khi họ có thể dung nạp thuốc uống.

Thuốc Cellcep 500mg được dùng như thế nào?

- Thuốc Mycophenolate thường được dùng dưới dạng viên nang hoặc viên nén, tùy thuộc vào liều bạn cần. Mặc dù thuốc cũng được sản xuất dưới dạng tiêm truyền và dung dịch uống.
- Thông thường bạn sẽ được khuyên dùng một liều mỗi ngày trong tuần đầu tiên. Điều này sau đó sẽ tăng lên đến hai liều một ngày khi thuốc của bạn được tăng lên.
- Bạn không nên nghiền nát hoặc nhai thuốc Mycophenolate. Bạn nên luôn luôn nuốt toàn bộ. Bác sĩ hoặc dược sĩ sẽ tư vấn cho bạn về liều lượng chính xác.
- Điều quan trọng là tiếp tục dùng thuốc Mycophenolate ngay cả khi thuốc dường như không hoạt động lúc đầu. Phải tiếp tục dùng thuốc khi các triệu chứng của bạn bắt đầu cải thiện, vì điều này sẽ giúp kiểm soát tình trạng của bạn.



Thuốc Cellcept 500mg được dùng với liều lượng như thế nào?

Liều dùng cho người lớn

Sử dụng thuốc dạng viên uống, thuốc Cellcept cần lưu ý theo từng ca ghép tạng để áp dụng liều lượng khác nhau.

- Với ca ghép thận uống 1g thuốc, uống 2 lần/ ngày
- Với ca ghép gan: 1.5 g thuốc, uống 2 lần/ ngày
- Với ca ghép tim: 1.5 g thuốc, uống 2 lần/ ngày trong vòng 5 ngày sau khi ghép tim

Liều dùng cho trẻ nhỏ

- Sử dụng thuốc Cellcept cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi đến 18 tuổi với liều lượng tối đa 2 g mỗi ngày, uống 2 lần/ ngày. Chỉ sử dụng cho trẻ có diện tích da lớn hơn 1.5 m² và liều lượng khuyến cáo 600mg/m²
- Chưa có kiểm chứng lâm sàng cho trẻ dưới 2 tuổi, không nên sử dụng.
- Thuốc sử dụng đúng liều theo chỉ định của chuyên gia, bác sĩ. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng về thời gian và liều lượng. Khi quá liều cần báo ngay với bác sĩ và chuyên gia hoặc cơ quan y tế để có liệu pháp điều trị phù hợp.

Một số lưu ý trước khi dùng thuốc Cellcept



500mg

- Bạn không nên sử dụng thuốc CellCept nếu bạn bị dị ứng với mycophenolate mofetil, axit mycophenolic (Myfortic) hoặc với một thành phần gọi là Polysorbate 80.
- Thuốc Mycophenolate mofetil có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn, và có thể gây ra sự sản xuất quá mức của một số tế bào bạch cầu. Điều này có thể dẫn đến ung thư, nhiễm trùng não nghiêm trọng gây ra khuyết tật hoặc tử vong, nhiễm virus gây suy thận hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng khác.
- Thuốc CellCept có thể gây sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh khi sử dụng trong thai kỳ. Bạn sẽ cần phải thử thai âm tính trước và trong khi điều trị bằng thuốc.
- Bạn được coi là có thể mang thai (ngay cả khi bạn không hoạt động tình dục) từ tuổi dậy thì cho đến khi bạn đã mãn kinh ít nhất 12 tháng liên tục.
- Nếu bạn là đàn ông, hãy sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả nếu bạn tình của bạn có thể mang thai. Thuốc CellCept có trong tinh dịch và cũng có thể gây hại cho thai nhi nếu người cha đang sử dụng thuốc. Tiếp tục sử dụng biện pháp tránh thai trong ít nhất 90 ngày sau liều cuối cùng của bạn.
- Nếu có thai xảy ra trong quá trình điều trị, đừng ngừng sử dụng thuốc CellCept. Gọi cho bác sĩ của bạn để được hướng dẫn.
- Bạn không nên cho con bú trong khi sử dụng thuốc CellCept.

Để đảm bảo thuốc CellCept an toàn cho bạn, hãy nói với bác sĩ nếu bạn đã từng bị:



- Một loét dạ dày hoặc các vấn đề tiêu hóa
- Viêm gan b hoặc c, bệnh gan hoặc thận
- Phenylketon niệu hoặc pku (dạng lỏng của thuốc này có thể chứa phenylalanine)
- Thiếu hụt enzyme di truyền hiếm gặp như hội chứng lesch-nyhan hoặc hội chứng kelley-seegmiller



Thuốc Cellcept 500mg Mycophenolate mofetil thải ghép thận, tim, gan – Giá thuốc Cellcept – Thuốc đặc trị 247 (2)

Tôi nên tránh những gì khi sử dụng thuốc CellCept 500mg?



- Bạn không được hiến máu hoặc tinh trùng trong khi sử dụng thuốc CellCept, và trong ít nhất 6 tuần (đối với máu) hoặc 90 ngày (đối với tinh trùng) sau liều cuối cùng của bạn.
- Không nhận được vắc-xin “sống” trong khi sử dụng thuốc Mycophenolate mofetil. Vắc-xin có thể không hoạt động tốt trong thời gian này và có thể không bảo vệ bạn hoàn toàn khỏi bệnh. Vắc-xin sống bao gồm sởi , quai bị, rubella (MMR), bại liệt, rotavirus, thương hàn, sốt vàng da, thủy đậu (thủy đậu) và zoster (zona).
- Thuốc CellCept có thể làm bạn dễ bị cháy nắng hơn. Tránh ánh sáng mặt trời. Mặc quần áo bảo hộ và sử dụng kem chống nắng (SPF 30 trở lên) khi bạn ở ngoài trời.

Tác dụng phụ của thuốc CellCept 500mg

Mycophenolate

Nhận trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn có dấu hiệu phản ứng dị ứng với thuốc CellCept: nổi mề đay; khó thở; sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng của bạn.

Thuốc CellCept có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn và có thể khiến một số tế bào bạch cầu phát triển ngoài tầm kiểm soát.

Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có:



- Sốt, sưng hạch, đau miệng, triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm, nhức đầu , đau tai
- Đau dạ dày, nôn mửa, tiêu chảy, sụt cân
- Yếu ở một bên cơ thể, mất kiểm soát cơ bắp
- Nhầm lẫn, suy nghĩ vẩn đục, mất hứng thú với những thứ thường làm bạn quan tâm
- Đau hoặc rát khi bạn đi tiểu, đau quanh thận ghép
- Sung, ăm, đỏ hoặc chảy xung quanh vết thương ngoài da
- Một tổn thương da mới, hoặc một nốt ruồi đã thay đổi kích thước hoặc màu sắc.
- Phân có máu hoặc hắc ín, ho ra máu hoặc nôn trông giống như bã cà phê
- Dễ bị bầm tím, chảy máu cam, chảy máu nướu hoặc chảy máu bất thường khác
- Dấu hiệu tăng huyết áp như nhức đầu dữ dội, mờ mắt, đờ đập ở cổ hoặc tai, lo lắng , chảy máu mũi
- Dấu hiệu của số lượng tế bào máu thấp bao gồm sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, triệu chứng giống cúm, lở miệng, lở da, dễ bầm tím, chảy máu bất thường, da nhợt nhạt, tay và chân lạnh , cảm thấy nhẹ đầu hoặc khó thở.

Các tác dụng phụ phổ biến của thuốc CellCept 500mg có thể bao gồm:



- Đau dạ dày, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, táo bón
- Sưng ở mắt cá chân hoặc bàn chân của bạn
- Nhức đầu, chóng mặt, run rẩy, bị phát ban
- Sốt, đau họng hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác
- Số lượng tế bào máu thấp
- Tăng huyết áp hoặc nhịp tim.

Đây không phải là một danh sách đầy đủ các tác dụng phụ và những người khác có thể xảy ra. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ.

Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc CellCept 500mg?

Tránh dùng thuốc kháng axit cùng một lúc. Nếu bạn cũng dùng sevelamer , hãy uống ít nhất 2 giờ sau khi uống thuốc CellCept.

*Hãy cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc hiện tại của bạn.
Nhiều loại thuốc có thể tương tác với thuốc CellCept, đặc biệt là:*



- Azathioprine
- Cholestyramin
- Cyclosporine
- Thuốc kháng vi-rút – acyclovir , ganciclovir , valacyclovir , valganciclovir
- Một loại kháng sinh – amoxicillin , ciprofloxacin , metronidazole , norfloxacin , rifampin , thuốc sulfa (smx-tmp hoặc smz-tmp, và các loại khác)
- Thuốc giảm axit dạ dày bao gồm esomeprazole , lansoprazole , omeprazole , nexium , prevacid , prilosec , protonix , và các loại khác.
- Thuốc tránh thai

Danh sách này không đầy đủ và nhiều loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến thuốc CellCept. Điều này bao gồm thuốc theo toa và thuốc không kê đơn, vitamin và các sản phẩm thảo dược . Không phải tất cả các tương tác thuốc có thể được liệt kê ở đây.

Ảnh hưởng của thuốc CellCept đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Phụ nữ có khả năng sinh con

- Phụ nữ có khả năng sinh con phải sử dụng ít nhất một hình thức tránh thai đáng tin cậy trước khi bắt đầu trị liệu bằng thuốc CellCept, trong khi điều trị và trong sáu tuần sau khi ngừng trị liệu, trừ khi kiêng là phương pháp tránh thai được lựa chọn. Hai hình thức tránh thai bổ sung đồng thời được ưa thích.



Khả năng mang thai

- Thuốc CellCept chống chỉ định trong thai kỳ trừ khi không có phương pháp điều trị thay thế phù hợp để ngăn ngừa thải ghép.
- Điều trị không nên được bắt đầu mà không cung cấp kết quả thử thai âm tính để loại trừ việc sử dụng ngoài ý muốn trong thai kỳ.

Phụ nữ cho con bú

- Thuốc Mycophenolate mofetil đã được chứng minh là được bài tiết qua sữa của chuột cho con bú. Người ta không biết liệu chất này được bài tiết qua sữa mẹ.
- Do khả năng phản ứng phụ nghiêm trọng với thuốc Mycophenolate mofetil ở trẻ bú mẹ, thuốc CellCept chống chỉ định ở các bà mẹ cho con bú.



Thuốc Cellcept 500mg Mycophenolate mofetil thải ghép thận, tim, gan – Giá thuốc Cellcept – Thuốc đặc trị 247 (3)

Ảnh hưởng của thuốc CellCept đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

- Không có nghiên cứu về ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc đã được thực hiện.
- Hồ sơ dược lực học và các phản ứng bất lợi được báo cáo cho thấy rằng một tác dụng là không thể.

Thuốc Cellcept 500mg Mycophenolate mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Thuốc cellcept 500 mg với liều lượng mạnh sẽ là giải pháp chống đào thải nội tạng cấy ghép hiệu quả. Lưu ý, mọi quá trình sử dụng cần có sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa.

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516 / 0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp). Mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.

» Xem thêm thông tin thuốc cellcept 500mg

<https://thuocdactri247.com/thuoc-cellcept-500mg-mycophenolate-chong-dao-thai-ghep-tang>

» Xem thêm thuốc thải ghép prograf 1mg

<https://thuocdactri247.com/thuoc-prograf-1mg-gia-bao-nhieu-mua-thuoc-tacrolimus-o-dau/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Cellcept 500mg**



Mycophenolate với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất


tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

5.0 77



Like this:


Có liên quan



Thuốc cellcept
250mg
mycophenolate giá
bao nhiêu
19/12/2017
In "Thuốc thải ghép"



Thuốc neoral 25mg
cyclosporin chống thải
ghép thận
17/07/2017
In "Thuốc thải ghép"



Thuốc Ketosteril 100
viên điều trị bệnh
thận mạn
20/12/2017
In "Thuốc thải ghép"

