


- Procesi I tretjes se ushqimit realizohet ne aparatin tretes ,I cili fillon me gojen dhe perfundon ne vrimen anale.





- Tretja dhe perthithja realizohen nga aparati tretes, I cili perbehet nga gypi ose ndryshe kanali tretes dhe nga gjendrat anekse. Gypi tretes komunikon me mjedisin e jashtem permes gojes dhe anusit .

1.Gojaperpunim mekanik me ane te

ghiandola
parotide

dhembeve
dhemballeve


2.Gjendrat e pershtymes...nennofulla

nengjuha
paratiroide

Kane funksion lageshtues te ushqimit.

3.Ezofagu.....ushqyerja leviz l shture nga tkurrja e 25 muskujve duke e mbyllur kalimin siper dhe duke e cuar ushqimin poshte.

4.Stomaku....me acidin klorhidrik stomaku ben te denatyroj proteinat dhe te copetoj ushqimin.



Tretja ne zorre

5.Zorret perbehen nga:zorra e holle
zorra e trashe

Zorra e holle.....realizohet tratja kimike dhe perthithja e materialit te tretur.Zorra e holle ndahet ne tri pjese:duoden
jejunum
ileum

6. Zorra e trashe....perthith ujin,vitaminat dhe prodhon vitaminen k.

mëlçia


ezofagu

stomaku

zorra e hollë

zorra e trashë

rektusi



- Tretja eshte dy lloje:
- 1.Mekanike....copat e medha te ushqimit permes veprimit te kafshimitte dhembeve , copetohen ne pjeseza me te vogla, qe me pas mbrohen me force nepermjet veprimtarise se muskulatures se gypit tretes qe shkakton levizje peristatike.

- 2.Tretja kimike kryhet nga lengjet tretese qe prodhohen nga gjendrat e vendosura pergjate kanalit tretes.

- Po ashtu ne aparatin tretes merr pjese :
- Lengu pankreatik I cili permban disa enzima te cilat tresin sheqernat ,yndyrnat dhe proteinat.
- Lengu I temthit emulon yndyrat deri ne pika te vogla per tu zberthyer me pas nga lipaza.

SEMUNDJET QE PREKIN APARATIN TRETES

ASCISTI

Simtomat jane: fryrje e barkut, edema e kembeve
Shkaktohet nga: konsumimi i alkoolit, turbekulozi.

GASTRITI KRONIK

Eshte 2 lloje: tipi A ,tipi B. Shenjat jane: kane dhimbje, te
vjella, anoreksi , hemoragji .

ULCERA GASTRITE

Shenjat jane: djedie stomaku

HEPATITI

Shkakton inflamacione te melcise. Shenjat jane: diarre, dhimbje barku ,ethe,zverdhe e lekures.

ULCERA DOUDENALE

Simtomat jane:djegie stomaku pas ngrenies se ushqimit.

KOLITI ULCERATIV

Simtomat jane:dhimbje barku ,diarre.

DHIMBJA E STOMAKUT





A large, irregular blue thought bubble with a thin black outline is centered on the page. Inside the bubble, the word "faleminderit" is written in a white, lowercase, sans-serif font. To the bottom-left of the main bubble, there are three smaller, solid blue circles of increasing size, arranged in a diagonal line, suggesting a trail of thought or a sequence of bubbles.

faleminderit